

Observations de lépidoptères nocturnes au Château-Musée de Tourrette-Levens le 21 mai 2022

Plus d'une cinquantaine d'espèces de papillons nocturnes ont pu être observées lors de cette démonstration de techniques d'inventaires basées sur l'attraction de ces insectes par la lumière riche en rayons ultra-violets. Ce sont bien, dans l'ensemble, des espèces classiques du milieu méditerranéen au printemps.

Liste des espèces déjà identifiées :

Famille des Cossidae

Dyspessa ulula (La petite marbrure)

Famille des Blastobasidae

Blatobasis phycidella

Famille des Plutellidae

Plutella xylostella

Famille des Tortricidae

Clepsis consimilana

Ditula angustiorana

Hedya nubiferana

Famille des Pyralidae

Acrobasis obliqua

Bostra obsoletalis

Dioryctria mendacella

Ephestia woodiella

Epischnia prodromella

Etiella zinckenella

Lamoria anella

Pyralis regalis

Famille des Crambidae

Dolicharthria punctalis

Eudonia delunella

Mecyna asinalis

Nomophila noctuella

Pleuroptya balteata

Famille des Sphingidae

Deilephila porcellus (Le Petit Sphinx de la Vigne)

Famille des Lasiocampidae

Dendrolimus pini (Le Bombyx du Pin)

Famille des Saturniidae

Saturnia pavoniella (Le Petit Paon de Nuit)

Famille des Drepanidae

Watsonalla uncinula (Le Hameçon Méridional)

Famille des Geometridae

Chloroclysta v-ata

Eupithecia dodoneata

Eucrostes indigenata

Idaea degeneraria

Idaea filicata

Idaea ostrinaria

Idaea seriata

Lobophora halterata (La Phalène du Hêtre)

Peribatodes rhomboidaria

Pseudoterpna coronillaria

Famille des Notodontidae

Ptilodon cucullina (Le Capuchon)

Spatalia argentina (L'Argentine)

Famille des Nolidae

Nola confusalis

Nycteola sp.

Famille des Erebidae

Arctia villica (L'Ecaille fermière)

Catephya alchymista

Eilema caniola

Eilema sororcula

Ophiusa tirhaca (La Noctuelle Pistachière)

Famille des Noctuidae

Acronicta aceris

Autographa gamma

Caradrina flavirena

Charanyca trigrammica

Hoplodrina ambigua

Noctua pronuba

Oligia latruncula


Phlogophora meticulosa

Quelques photos :

* *Dyspessa ulula*, une espèce méridionale dont la chenille se développe souvent dans les bulbes d'ail. Sur la photo, on voit qu'il s'agit d'une femelle avec son abdomen long et son organe de ponte (l'ovipositeur) à l'extrémité :



* *Deilephila porcellus*, un très joli petit sphinx dont la chenille vit, entre autres, sur la vigne et les épilobes :




* *Lobophora halterata* : une phalène un peu surprenante pour ce secteur, car elle n'est pas connue pour fréquenter les milieux très méditerranéens :



* Deux représentants des Notodontidae, famille dont les chenilles ont souvent un aspect extravagant :


Spatialia argentina



Ptilodon cucullina



* *Ophiusa tirhaca*, une belle et grande noctuelle d'affinité subtropicale, très présente en méditerranée (la photo représente un exemplaire niçois, celui de samedi soir à Tourrette-Levens ayant été trop rapide pour le photographe !) :



* *Arctia villica*, l'écaille fermière : Comme chez de nombreuses Écailles, les couleurs vives permettent de surprendre les prédateurs lorsqu'elles ouvrent les ailes. De plus, cela informe également sur la toxicité ou le mauvais goût de l'insecte.



Bien sûr, les pièges lumineux attirent aussi d'autres groupes d'insectes que les papillons. Parmi les coléoptères observés lors de cette soirée, il faut noter la présence d'une espèce assez rare, de la famille des Cerambycidae : *Glaphyra umbellatarum*, caractérisée par des élytres très courts laissant dépasser les ailes sur l'abdomen et dont la larve se nourrit de Rosacées.



Glaphyra umbellatarum